

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 6-3-62 097154

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

1^{er} supplément au n° 18
5 / 3 / 1962

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER

Si la végétation marque un retard net sur les années précédentes, on observe çà et là un début de départ de végétation et certaines variétés portent des bourgeons au stade C 3. C'est à partir du stade D que les contaminations par la Tavelure peuvent se produire ; les boutons floraux qui seront très visibles à partir de E peuvent être anéantis par la maladie.

Or, la Tavelure du poirier est dans notre région toujours "relancée" par les germes issus des chancres à conidies qui constituent la forme hivernale de conservation partout présente quelles que soient les conditions climatiques de l'hiver.

Seuls les arboriculteurs qui auront réalisé un traitement d'hiver de prédébouillage à l'aide d'un produit contenant un colorant, auront considérablement réduit le nombre des chancres à conidies.

C'est pourquoi dans la plupart des vergers de poiriers, l'exécution rapide d'un traitement cuprique est nécessaire au plus tard au stade D 3. En cas de pluie, renouveler la protection. Cesser l'emploi des produits cupriques à partir du stade F pour recourir à un anticryptogamique de synthèse. Consulter notre édition spéciale concernant les produits.

MONILIA DE L'ABRICOTIER

Les conditions climatiques que nous subissons, créent des conditions favorables à la maladie qui trouvera un terrain propice dû à l'étalement de la floraison qui semble devoir être très longue. En conséquence, le traitement 2 bis doit être effectué. Mais il est fortement déconseillé l'utilisation d'un produit cuprique qui provoquerait des brûlures. Utiliser : le T.M.T.O. le Captane, le Zinèbe ou le Zirame.

Sur les arbres et les variétés à floraison tardive, le stade C n'étant pas dépassé, il faudra effectuer le traitement 1 bis.

INFORMATION

PECHER

Le renouvellement du traitement fongicide précédemment préconisé est indispensable sur tous les arbres où il a été lavé, le Monilia pouvant s'attaquer au pêcher.

AVIS IMPORTANT

Conserver avec soin le présent bulletin ; le tableau des stades repères reproduit au verso devant être utilisé en cours d'année.

L'Inspecteur,

P. BERVILLE

Les Contrôleurs,

L.L. TROUILLON

R. MARIO

1962-6

P 419

DEVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° 1 — STADES-REPÈRES DU POIRIER

